



Handelsbezeichnung	Nemahelp
Registernummer	2720-0
Art der Zubereitung	Sonstige (XX)
Wirkungstyp	Insektizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben	Wirkstoffgruppe
Entomopathogene Nematoden (Steinernema feltiae [NEAPGL])					

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
Biohelp - biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH	Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
Biohelp - biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH	Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich

Status	zugelassen
Beginn der Zulassung	28.09.2000
Datum der letzten Änderung	12.07.2021
Antrag auf Erneuerung	15.05.2024
Datum der letzten Erneuerung	18.03.2025
Ende der Zulassung	31.01.2040

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Zugelassene Indikationen

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis) Larven • Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae) Larven	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
2	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis) Larven • Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae) Larven	Büroräume, Wintergarten, Wohnräume	Nein	Nein	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Daten zuletzt aktualisiert am: 29.10.2025 0:05

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
3	Gemüsebau	• Zucht-Champignon (AGARBI)	• Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae) Larven	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
4	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC) • Kräuter, Gewürze und Heilkräuter/Arzneipflanzen (3HSMC)	• Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae) Larven • Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis) Larven	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
5	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC) Ausgenommen Erdbeeren	• Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae) Larven • Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis) Larven	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
6	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC) • Kräuter, Gewürze und Heilkräuter/Arzneipflanzen (3HSMC)	• Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae) Larven • Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis) Larven	Freiland	Nein	Nein	Nein		
7	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC) Ausgenommen Erdbeeren	• Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae) Larven • Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis) Larven	Freiland	Nein	Nein	Nein		
8	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae) Larven • Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis) Larven	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
9	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae) Larven • Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis) Larven	Freiland	Nein	Nein	Nein		
10	Obstbau	• Walnüsse (IUGRE)	• Walnussfruchtfliege (RHAGCO, Rhagoletis completa) Larven	Freiland	Nein	Nein	Nein		
11	Obstbau	• Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE) • Süßkirsche (PRNAV)	• Kirschfruchtfliege (RHAGCE, Rhagoletis cerasi) Larven	Freiland	Nein	Nein	Nein		
12	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	• Apfelwickler (CARPPO, Cydia pomonella) Zur Reduktion des Schädlingsdrucks im Frühjahr, Überwinternde Stadien	Freiland	Nein	Nein	Nein		
13	Obstbau	• Steinobst (3STFC) • Kernobst (3PMFC)	• Pfirsichwickler (LASPMO, Grapholita molesta) Überwinternde Stadien • Kleiner Fruchtwickler (CYDILO, Grapholita lobarzewskii) Überwinternde Stadien	Freiland	Nein	Nein	Nein		
14	Obstbau	• Steinobst (3STFC)	• Pflaumenwickler (LASPFU, Grapholita funebrana) Überwinternde Stadien	Freiland	Nein	Nein	Nein		
15	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	• Sägewespen (1HOPLG, Hoplocampa) Larven	Freiland	Nein	Nein	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Daten zuletzt aktualisiert am: 29.10.2025 0:05

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
16	Obstbau	• Steinobst (3STFC)	• Gelbe Pflaumensägewespe (HOPLFL, Hoplocampa flava) Larven • Schwarze Pflaumensägewespe (HOPLMI, Hoplocampa minuta) Larven	Freiland		Nein	Nein	Nein	



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
----------------	-------------------	------------	------------	--------	-----------------

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P261	Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben.	
P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung tragen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	Text	Betroffene Indikationen
EUH208	Enthält <i>Steinernema feltiae</i> (entomopathogene Nematodenart). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.	

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.
Nematoden können ein Potential zur Auslösung von Sensibilisierungsreaktionen haben.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen
Die Angaben zu Aufwandmenge, Anwendungszeitpunkt, maximale Anzahl der Anwendungen und zeitlicher Abstand in Tagen stellen Richtwerte dar und können gegebenenfalls in Verantwortung des Verwenders an die betriebs- und kulturspezifische Situation angepasst werden.
Das Pflanzenschutzmittel (Nützlingspräparat) ist nicht uneingeschränkt mit chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen kombinierbar.

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedstaat

Handelsbezeichnung

Zulassungsnummer



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 1

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Larven
Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae)	Larven

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		Max. 50 Mio. Nematoden/100 m ²				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Gießen oder Spritzen auf das Kultursubstrat

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 2

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Larven
Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae)	Larven

Anwendungsbereich Büroräume, Wintergarten, Wohnräume

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		Max. 500 000 Nematoden/m ²				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Gießen oder Spritzen auf das Kultursubstrat

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 3

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zucht-Champignon (AGARBI)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae)	Larven

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		50 Mio. Nematoden/100 m ²				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Gießen oder Spritzen auf das Kultursubstrat

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 4
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	
Kräuter, Gewürze und Heilkräuter/Arzneipflanzen (3HSMC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae)	Larven
Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Larven

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		50 Mio. Nematoden/100 m ²				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Gießen oder Spritzen auf das Kultursubstrat
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 5
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	Ausgenommen Erdbeeren

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae)	Larven
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Larven

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		50 Mio. Nematoden/100 m ²				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Gießen oder Spritzen auf das Kultursubstrat
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 6

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	
Kräuter, Gewürze und Heilkräuter/Arzneipflanzen (3HSMC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae)	Larven
Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Larven

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		5 Mrd. Nematoden/ha				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen oder Gießen auf den Boden

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 7
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	Ausgenommen Erdbeeren

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae)	Larven
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Larven

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		5 Mrd. Nematoden/ha				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Spritzen oder Gießen auf den Boden
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 8

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae)	Larven
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Larven

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		50 Mio. Nematoden/100 m ²				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Gießen oder Spritzen auf das Kultursubstrat

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 9

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermücken (1SCIAF, Sciaridae)	Larven
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Larven

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		5 Mrd. Nematoden/ha				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen oder Gießen auf den Boden

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 10

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Walnüsse (IUGRE)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Walnussfruchtfliege (RHAGCO, Rhagoletis completa)	Larven

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		5 Mrd. Nematoden/ha				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen oder Gießen auf den Boden

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 11
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)	
Süßkirsche (PRNAV)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kirschfruchtfliege (RHAGCE, Rhagoletis cerasi)	Larven

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		5 Mrd. Nematoden/ha				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Spritzen oder Gießen auf den Boden
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 12
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Apfelwickler (CARPP0, Cydia pomonella)	Zur Reduktion des Schädlingsdrucks im Frühjahr, Überwinternde Stadien

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		1,5 Mrd. Nematoden/ha/m behandelter Stamm bzw. behandeltes Kronengerüst				
		Max. 5 Mrd. Nematoden/ha				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall	97	Ende des Laubblattfalls		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Spritzen auf Stamm und Hauptäste
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 13
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Steinobst (3STFC)	
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pfirsichwickler (LASPMO, Grapholita molesta)	Überwinternde Stadien
Kleiner Fruchtwickler (CYDILO, Grapholita lobarzewskii)	Überwinternde Stadien

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,5 Mrd. Nematoden/ha/m behandelte Stamm bzw. behandeltes Stammgerüst						
Max. 5 Mrd. Nematoden/ha						Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall	97	Ende des Laubblattfalls		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Spritzen auf Stamm und Hauptäste
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 14

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Steinobst (3STFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pflaumenwickler (LASPFU, Grapholita funebrana)	Überwinternde Stadien

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		1,5 Mrd. Nematoden/ha/m behandelter Stamm bzw. behandeltes Stammgerüst				
		Max. 5 Mrd. Nematoden/ha				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall	97	Ende des Laubblattfalls		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen auf Stamm und Hauptäste

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 15

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Sägewespen (1HOPLG, Hoplocampa)	Larven

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		Max. 5 Mrd. Nematoden/ha				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen oder Gießen auf den Boden

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Nemahelp, 2720-0

Nr. 16

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Steinobst (3STFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Gelbe Pflaumensägewespe (HOPLFL, <i>Hoplocampa flava</i>)	Larven
Schwarze Pflaumensägewespe (HOPLMI, <i>Hoplocampa minuta</i>)	Larven

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		Max. 5 Mrd. Nematoden/ha				Nach Gebrauchsanweisung

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen oder Gießen auf den Boden

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>